

MAVER
Anestesia Alphacaine Lidocaína 2% con
Epinefrina 1:100.000 — 50 Carpules Vidrio

SKU: MAV102542
Categoría: Insumos / Cirugía Oral /
Anestesias Dentales / Con Vasoconstrictor
Marca: MAVER
País fabricante: Brasil (fabricante DFL)

INFORMACIÓN GENERAL	
Marca	MAVER (distribuidor) / DFL — Nova DFL (fabricante, Brasil)
Nombre comercial	Alphacaine
Tipo de producto	Anestésico local inyectable con vasoconstrictor
Principio activo	Clorhidrato de Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Forma farmacéutica	Solución inyectable
Vía administración	Infiltración / Bloqueo nervioso — mucosa o tejidos blandos
Clasificación ATC	N01BB52 — Lidocaína con epinefrina
Registro ISP	F-22815 (Chile)
Clase dispositivo	Dispositivo Médico Clase I / Medicamento de prescripción
Certificación	BPF — Buenas Prácticas de Fabricación (ANVISA, Brasil)
Sello calidad	ABO RECOMIENDA — Asociación Brasileña de Odontología
País de origen	Brasil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	
Formato / Presentación	Caja con 50 carpules (5 blísteres × 10 carpules)
Tipo de envase	Tubo de vidrio borosilicato con émbolo siliconizado
Volumen por carpule	1,8 mL
Contenido total caja	90 mL (50 × 1,8 mL)
Blíster	Lacrado — 10 carpules por blíster
Unidad de compra	Caja x 50 unidades
Unidad de venta	Caja x 50 unidades
Concentración	Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Inicio de acción	Rápido — 2 a 3 minutos
Duración anestesia pulpar	60 a 90 minutos
Duración tejidos blandos	3 a 5 horas
Vasoconstrictor	Sí — Epinefrina 1:100.000
Sin parabenos	Sí — libre de metilparabeno
Émbolo	Siliconizado — deslizamiento suave, reduce dolor
Visualización reflujo	Sí — vidrio transparente permite verificar aspiración
Contaminación polímeros	No — vidrio no se degrada
Etiqueta seguridad	Adhesiva envolvente con especificaciones completas

Temperatura almacen.	Ambiente — no requiere refrigeración
Protección luz	Conservar en caja original

COMPOSICIÓN POR CARPULE / DOSIS

Clorhidrato de Lidocaína / mL	20,0 mg
Clorhidrato de Lidocaína / carpule	36 mg
Epinefrina base / mL	10,0 µg
Epinefrina base / carpule	18 µg
Excipientes	Bisulfito de sodio, cloruro de sodio, agua para inyección
Dosis máxima lidocaína	4,4 mg/kg — máx. 500 mg en 24 h
Dosis máxima epinefrina	0,2 mg/kg — máx. 0,2 mg en 24 h

INDICACIONES CLÍNICAS

- Anestesia local en la mayoría de procedimientos odontológicos
- Tratamientos restauradores (operatoria, composite, amalgama)
- Cirugía oral general — extracciones simples y complejas
- Tratamientos endodónticos — pulpectomías y tratamientos de conducto
- Cirugías periodontales y procedimientos en encías
- Lesiones vascularizadas — por acción hemostática de la epinefrina
- Procedimientos en odontopediatría — dosis ajustada por peso
- Primera opción en pacientes embarazadas — perfil de seguridad documentado
- Prótesis e implantes — procedimientos que requieren campo quirúrgico limpio

VENTAJAS CLÍNICAS

- Único anestésico a base de lidocaína con epinefrina — mejor hemostasia y seguridad
- Solución anestésica más investigada del mundo — evidencia clínica abundante
- Primera opción en embarazadas — comprobada seguridad fetal
- Vidrio borosilicato — sin riesgo de contaminación por polímeros
- Émbolo siliconizado — menor dolor durante la inyección
- Blíster lacrado — protege contra contaminación externa
- Etiqueta adhesiva de seguridad — protege mucosa en caso de rotura del tubo
- Alta tasa de éxito anestésico — acción rápida y larga duración
- Sin parabenos — menor riesgo de reacciones alérgicas
- Certificación ANVISA y sello ABO RECOMIENDA — garantía de calidad

PROTOCOLO DE USO

1. Verificar integridad del blíster y del carpule antes de usar
2. Cargar el carpule en la jeringa carpule estéril verificando orientación correcta
3. Aspirar antes de inyectar para descartar posición intravascular
4. Inyectar lentamente — no superar 1 mL/minuto
5. Esperar 2-3 minutos para inicio de efecto antes de iniciar el procedimiento
6. Desechar el carpule usado — producto de un solo uso

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Uso exclusivo por profesionales de la salud dental
- Contraindicado en hipersensibilidad conocida a anestésicos tipo amida o epinefrina
- Precaución en pacientes con patología cardiovascular, hipertiroidismo o glaucoma de ángulo estrecho
- Reducir dosis en pacientes pediátricos, adultos mayores, insuficiencia hepática o renal

- No inyectar por vía intravenosa — aspirar siempre antes de administrar
- Vigilar signos de toxicidad sistémica (SNC y cardiovascular)
- No usar en áreas con infección activa — pH ácido reduce eficacia
- Desechar carpules parcialmente usados — no reutilizar entre pacientes
- Mantener fuera del alcance de niños

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura ambiente — no refrigerar
- Conservar en caja original cerrada, en lugar seco y limpio
- Proteger de la luz solar directa y humedad excesiva
- Verificar fecha de vencimiento antes de cada uso
- No utilizar si el carpule presenta daños, turbidez o partículas visibles

Documento de uso interno — Catálogo Dental Chile | MAVER — Anestesia Alphacaine Lidocaína 2% con Epinefrina 1:100.000 — 50 Carpules Vidrio | Dispositivo Médico

Clase I — ISP Chile