

MAVER
Anestesia Lidocaína 2% con Epinefrina Tubo
Plástico — 50 Carpules

SKU: MAV103154
Categoría: Insumos / Cirugía Oral /
Anestesias Dentales / Con Vasoconstrictor
Marca: MAVER
País fabricante: Colombia (fabricante New
Stetic) / Brasil (DFL)

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	MAVER (distribuidor)
Nombre comercial	Intracarelido-E / Intracare 2%
Tipo de producto	Anestésico local inyectable con vasoconstrictor — tubo plástico
Principio activo	Clorhidrato de Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Forma farmacéutica	Solución inyectable
Vía administración	Infiltración / Bloqueo nervioso
Clasificación ATC	N01BB52 — Lidocaína con epinefrina
Registro ISP	F-22815 (Chile)
Clase dispositivo	Dispositivo Médico Clase I / Medicamento de prescripción
País de origen	Colombia / Brasil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Formato / Presentación	Caja con 50 carpules (5 blísteres × 10 carpules)
Tipo de envase	Tubo plástico (polipropileno) con émbolo siliconizado
Volumen por carpule	1,8 mL
Contenido total caja	90 mL (50 × 1,8 mL)
Blíster	Lacrado — 10 carpules por blíster
Unidad de compra	Caja x 50 unidades
Unidad de venta	Caja x 50 unidades
Concentración	Lidocaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Inicio de acción	Rápido — 2 a 3 minutos
Duración anestesia pulpar	60 a 90 minutos
Duración tejidos blandos	3 a 5 horas
Vasoconstrictor	Sí — Epinefrina 1:100.000
Sin parabenos	Sí — libre de metilparabeno
Émbolo	Siliconizado — deslizamiento suave
Material envase	Plástico (polipropileno) — diferencia respecto a tubo vidrio
Temperatura almacen.	Ambiente

COMPOSICIÓN POR CARPULE / DOSIS

Clorhidrato de Lidocaína / mL	20,0 mg
-------------------------------	---------

Clorhidrato de Lidocaína / carpule	36 mg
Epinefrina / mL	10,0 µg
Epinefrina / carpule	18 µg
Excipientes	Metabisulfito de sodio, cloruro de sodio, agua para inyección
Dosis máxima lidocaína	4,4 mg/kg — máx. 500 mg en 24 h

INDICACIONES CLÍNICAS

- Anestesia local para cirugías periodontales
- Tratamientos endodóncicos y tratamientos de conducto
- Extracciones dentales simples y complejas
- Lesiones vascularizadas — acción hemostática
- Tratamientos restauradores y operatoria dental
- Procedimientos generales de cirugía oral

VENTAJAS CLÍNICAS

- Tubo plástico — alternativa para clínicas que prefieren menor riesgo de rotura
- Fórmula consagrada de lidocaína con epinefrina — eficacia comprobada
- Blíster lacrado — disminuye contaminación externa
- Sin parabenos — reduce riesgo de reacciones alérgicas
- Émbolo siliconizado — confort para el paciente durante la inyección
- 50 unidades por caja — formato eficiente para clínicas de alto volumen

PROTOCOLO DE USO

1. Verificar integridad del blíster y del carpule plástico
2. Cargar en jeringa carpule — verificar orientación del émbolo
3. Aspirar antes de inyectar para descartar posición intravascular
4. Inyectar lentamente — máximo 1 mL/minuto
5. Esperar 2-3 minutos para inicio de efecto
6. Desechar el carpule después de su uso — producto de un solo paciente

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Uso exclusivo por profesionales de la salud dental
- Contraindicado en hipersensibilidad a anestésicos tipo amida o sulfitos
- Precaución en cardiopatías, hipertiroidismo, glaucoma
- Reducir dosis en niños, adultos mayores e insuficiencia hepática
- No reutilizar carpules ni entre pacientes distintos
- No inyectar por vía intravenosa

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura ambiente — proteger de la luz y humedad
- Conservar en caja original
- Verificar fecha de vencimiento antes de usar
- No usar si el carpule presenta deformaciones o turbidez