

MAVER
Anestesia Mepivacaína 2% con Vasoconstrictor
Epinefrina 1:100.000 Mepiadre — 50 Carpules

SKU: MAV102546
Categoría: Insumos / Cirugía Oral /
Anestésias Dentales / Con Vasoconstrictor
Marca: MAVER
País fabricante: Brasil (fabricante DFL)

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	MAVER (distribuidor) / DFL — Nova DFL (fabricante, Brasil)
Nombre comercial	Mepiadre 2% 1:100.000
Tipo de producto	Anestésico local inyectable con vasoconstrictor
Principio activo	Clorhidrato de Mepivacaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Forma farmacéutica	Solución inyectable
Vía administración	Infiltración / Bloqueo nervioso
Clasificación ATC	N01BB53 — Mepivacaína con epinefrina
Registro ISP	F-19240/22 (Chile)
Clase dispositivo	Dispositivo Médico Clase I / Medicamento de prescripción
Certificación	BPF — ANVISA Brasil
País de origen	Brasil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Formato / Presentación	Caja con 50 carpules (5 blísteres × 10 carpules)
Tipo de envase	Tubo de vidrio con émbolo siliconizado
Volumen por carpule	1,8 mL
Contenido total caja	90 mL (50 × 1,8 mL)
Blíster	Lacrado — 10 carpules por blíster
Unidad de compra	Caja x 50 unidades
Unidad de venta	Caja x 50 unidades
Concentración	Mepivacaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Inicio de acción	Rápido — 30 seg a 2 min (maxilar sup.) / 1-4 min (mandíbula)
Duración anestesia pulpar	~60 minutos
Duración tejidos blandos	3 a 5 horas
Vasoconstrictor	Sí — Epinefrina 1:100.000
Sin parabenos	Sí
Émbolo	Siliconizado
Potencia relativa	2 (procaína = 1; lidocaína = 2)
Toxicidad relativa	1,5 a 2 (procaína = 1)
Acción vasodilatadora	Mínima — menor que otros anestésicos locales
Temperatura almacen.	Ambiente

COMPOSICIÓN POR CARPULE / DOSIS

Clorhidrato de Mepivacaína / mL	20,0 mg
Clorhidrato de Mepivacaína / carpule	36 mg
Epinefrina / mL	10,0 µg
Epinefrina / carpule	18 µg
Excipientes	Cloruro de sodio, metabisulfito de potasio, EDTA disódico, agua para inyección
Dosis máxima mepivacaína	5 mg/kg — máx. 300 mg por sesión
Dosis máxima epinefrina	0,2 mg por sesión

INDICACIONES CLÍNICAS

- Extracciones múltiples y prótesis inmediatas
- Procedimientos endodónticos de duración intermedia (~60 min)
- Cirugías orales generales — exodoncias, biopsias, frenectomías
- Infiltración o bloqueo nervioso en maxilar superior e inferior
- Procedimientos que requieren campo quirúrgico con control del sangrado
- Restauraciones dentales de mediana complejidad
- Procedimientos en pacientes con leve sensibilidad a vasoconstrictores

VENTAJAS CLÍNICAS

- Menor potencial vasodilatador — mayor duración natural del anestésico vs lidocaína
- Inicio de acción muy rápido — 30 seg en maxilar superior
- Epinefrina prolonga acción y reduce hemostasia quirúrgica
- Menor riesgo de metahemoglobinemia vs prilocaína
- Sin parabenos — menor riesgo alérgico
- Certificación BPF ANVISA — estándar de calidad farmacéutica
- 50 carpules por caja — ideal para clínicas con alto volumen
- Émbolo siliconizado — mayor comodidad para el paciente

PROTOCOLO DE USO

1. Verificar integridad del carpule y del blíster
2. Cargar en jeringa carpule de acero inoxidable
3. Aspirar antes de inyectar
4. Inyectar lentamente — no superar 1 mL/minuto
5. Esperar inicio de efecto (30 seg – 4 min según zona)
6. Completar procedimiento dentro del tiempo de acción pulpar (~60 min)
7. Desechar carpule — uso único por paciente

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Uso exclusivo profesional odontológico
- Contraindicado en hipersensibilidad a anestésicos tipo amida o epinefrina
- Contraindicado en taquicardia paroxística, arritmia absoluta, glaucoma ángulo estrecho
- Precaución en cardiopatías, hipertiroidismo, HTA grave
- Precaución en insuficiencia hepática — la mepivacaína se metaboliza hepáticamente
- Reducir dosis en pacientes pediátricos y adultos mayores
- Aspirar siempre antes de inyectar
- No usar en zonas con infección activa

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura ambiente — no refrigerar
- Conservar en caja original en lugar seco
- Proteger de la luz directa
- Verificar fecha de vencimiento antes de usar