

NEW STETIC

Anestesia Odontocaína Mepivacaína 2% con
Epinefrina 1:100.000 New Stetic — 50 Carpules
Vidrio

SKU: GE2385
Categoría: Insumos / Cirugía Oral /
Anestesia Dentales / Con Vasoconstrictor
Marca: NEW STETIC
País fabricante: Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	New Stetic S.A. (Colombia) — fundada en 1954, Medellín
Nombre comercial	Odontocaína® 2%
Tipo de producto	Anestésico local inyectable con vasoconstrictor
Principio activo	Clorhidrato de Mepivacaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Forma farmacéutica	Solución inyectable
Vía administración	Infiltración / Bloqueo nervioso
Clasificación ATC	N01BB53 — Mepivacaína con epinefrina
Clase dispositivo	Medicamento de prescripción — uso profesional odontológico
Código de barras	7701126802457
País de origen	Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Formato / Presentación	Caja con 50 carpules de vidrio
Tipo de envase	Cartucho de vidrio tipo carpule
Volumen por carpule	1,8 mL
Contenido total caja	90 mL (50 × 1,8 mL)
Unidad de compra	Caja x 50 unidades
Unidad de venta	Caja x 50 unidades
Concentración	Mepivacaína 2% + Epinefrina 1:100.000
Inicio de acción	Rápido — 1 a 3 minutos
Duración anestesia pulpar	~60 minutos
Duración tejidos blandos	3 a 5 horas (hasta 60 min procedimiento efectivo)
Vasoconstrictor	Sí — Epinefrina 1:100.000
Acción vasodilatadora	No posee — menor vasodilatación que lidocaína
Mecanismo	Estabiliza membrana neuronal — bloquea canales de Na ⁺
Temperatura almacen.	Ambiente

COMPOSICIÓN POR CARPULE / DOSIS

Mepivacaína clorhidrato / carpule	36 mg
Epinefrina base / carpule	0,018 mg (18 µg)

Excipientes	Benzoato de sodio, cloruro de sodio, metabisulfito de sodio, ácido clorhídrico, agua purificada c.s.p.
Dosis máxima mepivacaína	5 mg/kg — máx. 300 mg/sesión
Dosis máxima epinefrina	0,2 mg/sesión

INDICACIONES CLÍNICAS

- Anestesia local por infiltración o bloqueo nervioso en procedimientos odontológicos
- Procedimientos de hasta 60 minutos que requieren control del sangrado
- Extracciones dentales simples y complejas
- Tratamientos endodóncicos — pulpectomías y tratamientos de conducto
- Procedimientos protéticos — tallado de muñones y prótesis fija
- Cirugía oral en general — exodoncias múltiples, frenectomía
- Operatoria dental de mediana complejidad

VENTAJAS CLÍNICAS

- Propiedades farmacológicas similares a lidocaína con menor vasodilatación propia
- Epinefrina prolonga acción y reduce absorción sistémica
- Acción intermedia — adecuada para amplia gama de procedimientos
- Carpule de vidrio — permite visualización del reflujo sanguíneo
- Fabricante New Stetic — 70 años de experiencia en materiales dentales colombianos
- 50 unidades por caja — eficiencia en clínicas de alto volumen
- Perfil de seguridad comparable a otros anestésicos tipo amida

PROTOCOLO DE USO

1. Verificar integridad del carpule y ausencia de turbidez
2. Cargar en jeringa carpule y verificar orientación correcta
3. Aspirar antes de inyectar para descartar posición intravascular
4. Inyectar lentamente
5. Esperar 1-3 minutos para inicio de efecto
6. Planificar procedimiento dentro de los ~60 minutos de acción pulpar
7. Desechar carpule — producto de un solo uso

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Uso exclusivo por profesionales odontológicos capacitados
- Contraindicado en hipersensibilidad conocida a mepivacaína o epinefrina
- Contraindicado en bloqueos cardíacos graves no compensados, epilepsia no controlada, porfiria aguda
- Precaución en HTA grave, tirotoxicosis, insuficiencia cerebrovascular
- Precaución en insuficiencia hepática — metabolismo hepático
- Reducir dosis en niños (dosis por peso) y adultos mayores
- Aspirar siempre antes de inyectar
- Evitar en zonas con infección activa
- Evaluar riesgo/beneficio en embarazo

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura ambiente — no refrigerar
- Conservar en caja original en lugar seco y limpio
- Proteger de la luz directa
- Verificar fecha de vencimiento antes de cada uso
- No usar si el carpule está dañado o la solución está turbia

